



LUÍS TOMÉ

TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, LDA
INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DO CENTRO, COIMBRA
Urb. Quinta da Portela · R. Eduardo Correia · Lote 20, 11, Loja C

SEDAÇÃO ANESTÉSICA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Ana Filipa Ribeiro, Médica Anestesista

SEDAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS EM GASTROENTEROLOGIA

A sedação permite obter um estado de conforto, relaxamento e ausência de dor, de forma a facilitar o exame, por ação de medicamentos anestésicos, analgésicos e/ou sedativos, que são administrados por via endovenosa (veia). As doses são adequadas a cada pessoa, de acordo com as suas características pessoais, sensibilidade aos fármacos, estado clínico e procedimento a realizar. Através de diferentes métodos clínicos e instrumentais, são controladas e vigiadas as funções vitais, cardíaca, respiratória, cerebral e outras.

O anesthesiologista é o responsável por realizar e controlar todo o processo de sedação, assim como tratar todas as complicações que possam surgir. A sedação durará apenas o tempo necessário para a realização do procedimento, embora seja possível que só tenha memória passado algum tempo.

Algumas doenças poderão aumentar o risco de complicações anestésicas, nomeadamente doenças respiratórias, cardíacas, diabetes, obesidade e hipertensão arterial, entre outras. Assim, deverá sempre referir ao anesthesiologista todas as suas doenças, medicação, alergias e eventuais complicações em anestésias anteriores. Deverá ainda colocar todas as dúvidas que considere pertinentes.

Como para qualquer outro procedimento clínico, existem riscos e possíveis complicações associadas, nomeadamente:

- ▶ **Punções (picadas) repetidas** por dificuldade na introdução do cateter venoso, podendo haver a formação de hematomas, que habitualmente desaparecem após alguns dias.
- ▶ Durante a sedação, poderão surgir sinais e/ou sintomas, como **descida ou aumento da pressão arterial, descida ou aumento da frequência cardíaca, náuseas, vômitos, dificuldade ou depressão respiratória, agitação ou sedação excessiva**. Na maioria das vezes são passageiros ou reversíveis e não deixam sequelas.
- ▶ **Reação alérgica** a fármacos administrados, que pode ocorrer mesmo na ausência de reações alérgicas prévias, habitualmente sem gravidade.

- ▶ **Broncoaspiração** do conteúdo gástrico (passagem para os pulmões do conteúdo do estômago). A fim de minimizar este risco é obrigatório um jejum de, pelo menos, 6h.

DECLARAÇÃO DO UTENTE / SEU REPRESENTANTE

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação e, ter-me sido dado tempo suficiente para refletir sobre esta proposta.

Autorizo o acto indicado, bem como os procedimentos diretamente relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões clínicas fundamentadas.

O doente

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ___/___/_____

O seu representante legal

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ___/___/_____

Notas:

- Por favor, leia atentamente todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecido(a). Verifique se todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento.
- O presente documento foi redigido com base na Norma nº 015/2013 da DGS de 03/10/2013, da Direção Geral da Saúde e, o pedido de assinatura do mesmo resulta da recomendação constante desta Norma.